

Acelerando la eliminación de la malaria *P. vivax*

Acerca de PAVE

La Alianza para la Eliminación del Vivax (PAVE), liderada por PATH y Medicines for Malaria Venture (MMV), reúne a los Programas Nacionales de Malaria (PNM), a los investigadores, a los financiadores y a otras organizaciones para apoyar a los países en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos de eliminación mediante:

- Trabajo con los PNM para identificar las estrategias y herramientas óptimas para la cura radical en sus respectivos contextos.
- Generación y compartición de evidencia de alta calidad sobre el manejo de casos de *Plasmodium vivax* (*P. vivax*) para fundamentar las decisiones políticas y la implementación por parte de los gobiernos nacionales
- Avance en el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos y diagnósticos de calidad garantizada para *P. vivax*.



PAVE facilita el acceso a diagnósticos y tratamientos de la malaria, nuevos y existentes, para la eliminación de *P. vivax*


Eliminación de la malaria *P. vivax*

La eliminación de la malaria es un objetivo ambicioso, y la malaria *P. vivax* recurrente supone un gran obstáculo para su realización. En los países que están cerca de la eliminación, la disminución de la carga de *P. vivax* suele ir por detrás de la de *P. falciparum*. El parásito *P. vivax* tiene una fase hepática latente -el "hipnozoíto"- que puede activarse semanas, meses o años después de la infección inicial, lo que dificulta su eliminación. El diagnóstico y el tratamiento de cura radical requieren el uso coordinado de (1) un diagnóstico de la fase sanguínea de la malaria (ya sea una prueba de diagnóstico rápido o por microscopía), (2) una prueba de diagnóstico de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), (3) un antimalárico para la fase sanguínea, ya sea cloroquina (CQ) o una terapia combinada basada en la artemisinina (ACT) (según las estrategias nacionales), y (4) tafenoquina (TQ) o primaquina (PQ) para eliminar los parásitos del hígado y prevenir la recaída. Tanto la TQ como la PQ pueden provocar una hemólisis grave en los pacientes con deficiencia de G6PD. Por ello, es obligatorio realizar la prueba de G6PD antes de utilizar la TQ, ya que los pacientes solo pueden ser tratados si tienen una actividad enzimática $\geq 70\%$. También se recomienda realizar la prueba de G6PD antes de utilizar PQ para orientar el uso y dosificación adecuados.

Nuevas herramientas para la cura radical

Prueba estándar de malaria

Prueba cuantitativa de G6PD



Mejorando los resultados de *P. vivax*

TRATAMIENTO DE 7/14 DÍAS

TRATAMIENTO DE 3 DÍAS

	Día	1	2	3	4	5	6	7
PQ	Semana 1	●	●	●	●	●	●	●
	Semana 2	●	●	●	●	●	●	●
CQ/ACTs		■	■	■	*opción para 7 días 0,5mg/kg/día			
TQ		●						
CQ		■	■	■				

Prueba cuantitativa para medir la actividad de la G6PD

La prueba de G6PD STANDARD™ proporciona una medida cuantitativa de los niveles de actividad de la enzima G6PD de un paciente. El dispositivo portátil SD Biosensor proporciona el nivel de G6PD del paciente y la medición de la hemoglobina en 2 minutos, mediante un pinchazo en el dedo. Desde agosto de 2022, la prueba está registrada/disponible en más de 18 países. Además, la prueba recibió la aprobación de la Administración de Bienes Terapéuticos de Australia (TGA, por sus siglas en inglés) en 2021 y recibirá la del Panel de Revisión de Expertos del Fondo Mundial para Diagnósticos hasta julio de 2023.

Tafenoquina: un tratamiento de prevención de recaídas de dosis única

La TQ es un tratamiento de dosis única para la fase hepática que proporciona una cura radical de la malaria por *P. vivax* cuando se utiliza en combinación con la CQ. La TGA australiana y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobaron la TQ en 2018 para pacientes mayores de 16 años. Ahora está registrada para la misma población en Brasil, Colombia, Perú y Tailandia. En marzo de 2022, la TGA australiana aprobó el uso de TQ para niños de 2 años o más. La aprobación incluye un novedoso comprimido de 50 mg que puede disolverse en agua para facilitar su uso en niños.

Primaquina pediátrica para la prevención de recaídas

PAVE está apoyando a Fosun Pharma en el desarrollo de una tableta de PQ soluble de 2,5 mg y 5 mg para hacer frente al déficit de suministro en el tratamiento pediátrico de la malaria recurrente. Si se aprueba por precalificación de la OMS, será la primera formulación disponible de PQ pediátrica de calidad garantizada.

Generación de evidencia sobre el manejo de casos de *P. vivax*

Como apoyo a los ministerios de salud, y bajo el liderazgo de socios de investigación locales, PAVE está llevando a cabo estudios de viabilidad para investigar el óptimo uso de los tratamientos y diagnósticos de *P. vivax* para apoyar la eliminación de la malaria. Hay estudios previstos en Perú, Etiopía, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Para más información, visite el [centro de información sobre *P. vivax*](#).

PAVE recopila datos para apoyar las decisiones sobre políticas nacionales de los países donde la malaria es endémica. Se han elaborado o se están elaborando informes sobre el panorama nacional en la mayoría de los países donde el *P. vivax* es endémico. Se están realizando hojas de ruta para su integración en los planes estratégicos nacionales mediante talleres de planificación de preparación en Pakistán y Papúa Nueva Guinea. Visite la [base de datos de estudios](#) para obtener una visión general de los estudios de investigación sobre *P. vivax*; y el [sitio de la Comunidad de Práctica de Investigación Operativa de G6PD](#) para obtener información práctica sobre el uso de la prueba de G6PD.

Progreso

Las Américas

En Brasil, se esperan los resultados del Estudio de Despliegue de Tafenoquina (TRuST) en el cuarto trimestre de 2022. En Colombia, se está llevando a cabo un programa educativo piloto para evaluar la eficacia de la formación de los trabajadores de salud comunitarios y otro personal de salud en el diagnóstico de la deficiencia de G6PD. El Ministerio de Salud de Perú aprobó una hoja de ruta para la adopción de estas herramientas en el país, desarrollada con PAVE.


Asia-Pacífico

PAVE prestó apoyo técnico a los PNM de Camboya y la RDP de Lao para convertirse en los primeros países de la región en implantar las pruebas de G6PD. En Tailandia, está en marcha el estudio Evaluación del tratamiento de cura radical en la atención rutinaria (ARCTIC, por sus siglas en inglés), cuyos resultados se esperan para el primer trimestre de 2023. En Vietnam y Myanmar, PAVE ayudó a los PNM a actualizar sus materiales de formación sobre *P. vivax*. Se espera que Vietnam ponga en marcha las pruebas de G6PD en el cuarto trimestre de 2022. Junto con el Grupo de Trabajo sobre Vivax de la APMEN, se llevó a cabo un ejercicio de priorización para identificar las brechas y prioridades actuales dirigidas a la eliminación de *P. vivax*. PAVE participó en la Misión Conjunta de Seguimiento de la Malaria de la OMS en la India, que brindó la oportunidad de hacer hincapié en *P. vivax*, las pruebas de G6PD y la cura radical.

Cuerno de África

PAVE participó en una reunión de revisión del comportamiento de la malaria y en el foro científico nacional sobre la malaria en Etiopía.

Casos estimados de *P. vivax* en 2020, por país



PAVE consolida el trabajo de proyectos de múltiples financiadores y se alinea con los socios nacionales y la OMS para acelerar el progreso. La alianza combina inversiones de Unitaid, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y la financiación principal de MMV, entre otros. Si desea más información sobre nuestro trabajo, póngase en contacto con pave@path.org